Mathématiques : Polynésie Septembre 2024 Jour 1

> **Exercice 1**

1. On calcule $P(E \cap B)$:

$$P(E \cap B) = P(E) \times P_E(B)$$

$$P(E \cap B) = 0,6 \times 0,75$$

$$P(E \cap B) = 0,45$$

La probabilité que l'acheteur choisisse un véhicule tout-électrique et qu'il ait la possibilité d'installer une borne de recharge à son domicile est de 0,45.

2. Les événements E et $\bar{E}$ forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales :

$$P(B) = P(E \cap B) + P(\bar{E} \cap B)$$

$$P(B) = P(E \cap B) + P(\bar{E}) \times P_{\bar{E}}(B)$$

$$P(B) = 0,45 + 0,4 \times 0,52$$

$$P(B) = 0,658$$

3. On calcule $P_B(E)$:

$$P_B(E) = \frac{P(E \cap B)}{P(B)}$$

$$P_B(E) = \frac{0,45}{0,658}$$

$$P_B(E) \approx 0,684$$

La probabilité qu'un acheteur choisisse un véhicule tout-électrique sachant qu'il a la possibilité d'installer une borne de recharge à son domicile est de 0,684.

4. a. Un acheteur peut installer une borne de recharge à son domicile ou pas est une épreuve de Bernoulli dont le succès « L'acheteur peut installer une borne de recharge à son domicile » a une probabilité $p = 0,658$.

On répète 50 fois de manière identique et indépendante cette expérience. On a un schéma de Bernoulli de paramètres $n = 20$ et $p = 0,658$.

Ainsi la variable aléatoire X qui donne le nombre total d'acheteurs pouvant installer une borne de recharge à leur domicile parmi l'échantillon de 20 acheteurs suit une loi binomiale de paramètres $n = 20$ et $p = 0,658$.

b. Calculons $P(X = 8)$ avec la formule de la loi binomiale :

$$P(X = 8) = \binom{20}{8} \times 0,658^8 \times (1 - 0,658)^{20-8}$$

$$P(X = 8) \approx 0,011$$

c. Calculons $P(X \geq 10)$ à la calculatrice :

Sur Numworks :	Sur TI : (binomFrép)	Sur Casio : (Bcd)

$$P(X \geq 10) = 0,954$$

d. Pour une loi binomiale de paramètres n et p , on a $E(X) = n \times p$

$$E(X) = 20 \times 0,658$$

$$E(X) = 13,16$$

e. Soit Y la variable aléatoire qui compte le coût total de l'installation d'une borne de recharge au domicile des acheteurs. Ainsi $Y = 1200X$.

La somme moyenne à prévoir est donnée par $E(Y)$:

$$E(Y) = E(1200X)$$

Par linéarité de l'espérance on a :

$$E(Y) = 1200 E(X)$$

$$E(Y) = 1200 \times 13,16$$

$$E(Y) = 15792$$

En moyenne, la directrice peut prévoir d'engager 15 792€ pour cette offre lors de la vente de 20 véhicules.

> Exercice 2

1. f est définie sur $\mathbb{R}$ et dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$.

$$\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = e^x + 1$$

$\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) > 0$ donc f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty. \text{ Par somme } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty. \text{ Par somme } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

L'affirmation A est vraie.

La fonction f est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

$$-2 \in]-\infty; +\infty[$$

D'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = -2$

admet une unique solution dans $\mathbb{R}$.

L'affirmation B est fausse.

$$2. \frac{\ln(x) - x^2 + 2}{3x^2} = \frac{x^2 \left(\frac{\ln(x)}{x^2} - 1 + \frac{2}{x^2} \right)}{3x^2} = \frac{1}{3} \left(\frac{\ln(x)}{x^2} - 1 + \frac{2}{x^2} \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^2} = 0 \text{ par croissance comparée.}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{x^2} \right) = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} -1 = -1 \text{ donc par somme } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln(x)}{x^2} - 1 + \frac{2}{x^2} \right) = -1$$

$$\text{Par produit } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{3} \left(\frac{\ln(x)}{x^2} - 1 + \frac{2}{x^2} \right) = -\frac{1}{3}.$$

L'affirmation C est vraie.

3. Etudions le signe de $k(x) = 1 + 2e^{-x^2+1}$:

$$\forall x \in \mathbb{R}, e^{-x^2+1} > 0 \text{ donc } k(x) > 0$$

Une primitive de $k(x)$ sur $\mathbb{R}$ est donc strictement croissante.

L'affirmation D est fausse.

4. Vérifions si $g(x)$ est solution de (E) :

$$g(0) = 4e^{-\frac{1}{3} \times 0} + 1$$

$$g(0) = 5$$

$$g'(x) = -\frac{1}{3} \times 4e^{-\frac{1}{3}x} = -\frac{4}{3}e^{-\frac{1}{3}x}$$

Ainsi :

$$3g'(x) + g(x) = 3 \times \left(-\frac{4}{3}e^{-\frac{1}{3}x} \right) + 4e^{-\frac{1}{3}x} + 1$$

$$3g'(x) + g(x) = -4e^{-\frac{1}{3}x} + 4e^{-\frac{1}{3}x} + 1$$

$$3g'(x) + g(x) = 1$$

$g(x)$ est solution de l'équation différentielle (E) avec $g(0)=5$.

L'affirmation E est vraie.

5. Soient $u(x) = x$ et $v(x) = -e^{-x}$ deux fonctions continues sur $\mathbb{R}$.

$$u'(x) = 1 \text{ et } v'(x) = e^{-x}.$$

Par intégration par parties, on a :

$$\int_0^1 u(x)v'(x)dx = [u(x)v(x)]_0^1 - \int_0^1 u'(x)v(x)dx$$

$$\int_0^1 xe^{-x}dx = [-xe^{-x}]_0^1 - \int_0^1 (-e^{-x})dx$$

$$\int_0^1 xe^{-x}dx = [-xe^{-x}]_0^1 - [e^{-x}]_0^1$$

$$\int_0^1 xe^{-x}dx = (-e^{-1} + 0) - (e^{-1} - 1)$$

$$\int_0^1 xe^{-x}dx = 1 - 2e^{-1}$$

L'affirmation F est vraie.

> **Exercice 3**

1. Dans une pyramide à étages, le 1^{er} étage est composé d'1 boule, le 2^{ème} étage est composé de 4 boules, le 3^{ème} étage est composé de 9 boules et le 4^{ème} étage est composé de 16 boules.

$$1 + 4 + 9 + 16 = 30$$

Une pyramide à 4 étages est composée de 30 boules.

2. a. Calculons S_5 :

$$S_5 = u_1 + u_2 + u_3 + u_4 + u_5$$

$$S_5 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2$$

$$S_5 = 1 + 4 + 9 + 16 + 25$$

$$S_5 = 55$$

b.

```
def pyramide(n) :  
    S = 0  
    for i in range(1, n+1) :  
        S = S + i**2  
    return S
```

c.

$$\frac{\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2}{6} + (n+1)^2 = \frac{\frac{n(n+1)(2n+1)+6(n+1)^2}{6} + (n+1)^2}{6}$$
$$\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = \frac{(n+1)[n(2n+1) + 6(n+1)]}{6}$$
$$\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = \frac{(n+1)(2n^2 + n + 6n + 6)}{6}$$

$$\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = \frac{(n+1)(2n^2+7n+6)}{6}$$

-2 est une racine évidente de $2n^2 + 7n + 6$. Le polynôme se factorise par $(n+2)$.

$$\begin{aligned} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 &= \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6} \\ \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 &= \frac{(n+1)(n+2)(2n+2+1)}{6} \\ \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 &= \frac{(n+1)(n+2)[2(n+1)+1]}{6} \end{aligned}$$

d. Soit $P(n)$ la propriété : $S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ pour tout $n \geq 1$.

Initialisation :

$$S_1 = 1 \text{ et } \frac{1 \times (1+1) \times (2 \times 1 + 1)}{6} = 1$$

$P(1)$ est vraie.

Hérédité : Supposons la propriété $P(n)$ vraie pour un entier naturel n non nul.

C'est-à-dire $S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$. Montrons que $P(n+1)$ est vraie c'est-à-dire :

$$S_{n+1} = \frac{(n+1)(n+2)[2(n+1)+1]}{6}$$

Par hypothèse de récurrence :

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \\ S_n + u_{n+1}^2 &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + u_{n+1}^2 \\ S_{n+1} &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 \\ S_{n+1} &= \frac{(n+1)(n+2)[2(n+1)+1]}{6} \end{aligned}$$

$P(n+1)$ est vraie.

Conclusion : La propriété est vraie au rang 1 et elle est héréditaire donc $S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ pour tout $n \geq 1$.

3. On cherche la solution de l'équation $S_n = 200$.

À la calculatrice, on obtient $S_7 = 140$ et $S_8 = 204$.

Un marchand souhaitant disposer des oranges en pyramide à base carrée et possédant 200 oranges peut construire une pyramide à 7 étages maximum. Il utilise 140 oranges et il lui en reste 60.

> **Exercice 4**

1. Les coordonnées des points E et C dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$ sont :
 $E(0; 0; 1)$ et $C(1; 1; 0)$

2. a. Première méthode :

$\overrightarrow{DB} \perp \overrightarrow{AC}$ par propriété dans le carré ABCD

$\overrightarrow{DB} \perp \overrightarrow{DH}$ par propriété dans le cube ABCDEFGH et $\overrightarrow{DH} = \overrightarrow{AE}$ donc $\overrightarrow{DB} \perp \overrightarrow{AE}$.

Ainsi $\overrightarrow{DB}$ est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires de (GEA) donc $\overrightarrow{DB}$ est normal au plan (GEA) .

Deuxième méthode :

$$\overrightarrow{GE} \begin{pmatrix} 0-1 \\ 0-1 \\ 1-1 \end{pmatrix} \quad \overrightarrow{GA} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{EA} \begin{pmatrix} 0-1 \\ 0-1 \\ 0-1 \end{pmatrix} \quad \overrightarrow{EA} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Les vecteurs $\overrightarrow{GE}$ et $\overrightarrow{GA}$ ne sont pas colinéaires car leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles.

$$\overrightarrow{DB} \begin{pmatrix} 1-0 \\ 0-1 \\ 0-0 \end{pmatrix} \quad \overrightarrow{DB} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{GE} \cdot \overrightarrow{DB} = -1 \times 1 + (-1) \times (-1) + 0 \times 0 = -1 + 1 = 0$$

Ainsi $\overrightarrow{GE}$ est orthogonal à $\overrightarrow{DB}$.

$$\overrightarrow{GA} \cdot \overrightarrow{DB} = -1 \times 1 + (-1) \times (-1) + (-1) \times 0 = -1 + 1 = 0$$

Ainsi $\overrightarrow{GA}$ est orthogonal à $\overrightarrow{DB}$.

$\overrightarrow{DB}$ est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan (GEA) donc $\overrightarrow{DB}$ est normal au plan (GEA) .

- b. Une équation cartésienne du plan (GEA) de vecteur normal $\overrightarrow{DB} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ passant par $A(0; 0; 0)$ est :

$$1 \times x - 1 \times y + 0 \times z + c = 0$$

$$x - y + c = 0$$

Les coordonnées de A vérifient l'équation cartésienne du plan (GEA) :

$$0 - 0 + c = 0$$

$$c = 0$$

Une équation cartésienne du plan (GEA) est $x - y = 0$.

3. a. $\overrightarrow{EL} \begin{pmatrix} 1-m-0 \\ 1-0 \\ 1-1 \end{pmatrix} \quad \overrightarrow{EL} \begin{pmatrix} 1-m \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$\overrightarrow{KC} \begin{pmatrix} 1-m \\ 1-0 \\ 0-0 \end{pmatrix} \quad \overrightarrow{KC} \begin{pmatrix} 1-m \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

On a $\vec{EL} = \vec{KC}$ donc $CKEL$ est un parallélogramme.

$$\text{b. } \vec{KE} \begin{pmatrix} 0-m \\ 0-0 \\ 1-0 \end{pmatrix} \quad \vec{KE} \begin{pmatrix} -m \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \vec{KC} \cdot \vec{KE} &= (1-m) \times (-m) + 1 \times 0 + 0 \times 1 \\ \vec{KC} \cdot \vec{KE} &= m(m-1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c. } \vec{KC} \cdot \vec{KE} &= 0 \\ \Leftrightarrow m(m-1) &= 0 \\ \Leftrightarrow m = 0 \text{ ou } (m-1) &= 0 \\ \Leftrightarrow m = 0 \text{ } m = 1 & \end{aligned}$$

Pour $m = 0$ ou $m = 1$ les vecteurs $\vec{KC}$ et $\vec{KE}$ sont orthogonaux donc (KC) est perpendiculaire à (KE) . Or, $CKEL$ est un parallélogramme. Si un parallélogramme possède un angle droit alors c'est un rectangle.

Donc $CKEL$ est un rectangle quand $m = 0$ ou $m = 1$.

4. a. Montrons que, pour $m = \frac{1}{2}$, le parallélogramme $CKEL$ a deux côtés consécutifs de même longueur.

Pour $m = \frac{1}{2}$:

$$\vec{CK} \begin{pmatrix} \frac{1}{2}-1 \\ 0-1 \\ 0-0 \end{pmatrix} \quad \vec{CK} \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ donc } CK = \sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + (-1)^2 + 0^2} = \frac{\sqrt{5}}{2}.$$

$$\vec{KE} \begin{pmatrix} -m \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \vec{KE} \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ donc } KE = \sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + 0^2 + (-1)^2} = \frac{\sqrt{5}}{2}.$$

$CK = KE$. $CKEL$ est un parallélogramme avec deux côtés consécutifs de même longueur donc $CKEL$ est un losange quand $m = \frac{1}{2}$.

b.

$$\begin{aligned} \vec{KC} \cdot \vec{KE} &= m(m-1) \\ KC \times KE \times \cos(\widehat{CKE}) &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - 1 \right) \end{aligned}$$

$$KC \times KE \times \cos(\widehat{CKE}) = -\frac{1}{4}$$

$$\cos(\widehat{CKE}) = \frac{-\frac{1}{4}}{KC \times KE}$$

$$\cos(\widehat{CKE}) = \frac{-\frac{1}{4}}{\frac{\sqrt{5}}{2} \times \frac{\sqrt{5}}{2}}$$

$$\cos(\widehat{CKE}) = -\frac{1}{5}$$

$$\widehat{CKE} = 102^\circ$$